



## مقاله پژوهشی

# بررسی اثر هارمالین بر سطح سرمی آنزیم‌های شاخص کبدی در مدل کبد چرب غیرالکلی موش‌های نر نژاد NMRI

طناز کوثری، هانیه جعفری\*، پریچهره یغمایی

گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

\*مسئول مکاتبات: h-jafary@srbiau.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

## چکیده

یکی از شایع‌ترین اختلالات کبدی در حال حاضر، کبد چرب می‌باشد که امروزه به دلیل سبک نادرست زندگی، مبتلایان به آن در جهان رو به افزایش است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ماده موثره گیاه اسپند یعنی هارمالین، بر سطح سرمی آنزیم‌های شاخص کبدی در موسهای مبتلا به کبد چرب غیرالکلی می‌باشد. در این تحقیق از ۴۰ سر موش نر بالغ نژاد NMRI که به ۵ گروه ۸ تابی شامل گروه‌های کنترل، HFD، شم (HFD دریافت کننده آب مقطر که حلال هارمالین می‌باشد)، دریافت کننده هارمالین ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند، استفاده شد. هارمالین به صورت داخل صفاقی و به مدت ۴ هفته تزریق شد. برای ارزیابی عملکرد کبد، سطوح سرمی آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلکالین فسفاتاز (ALP) و پروفایل لیپیدی (کلسترول، LDL و HDL) در بافت کبد نیز بررسی شدند. بررسی‌های هیستولوژیکی با استفاده از رنگ گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسیدیدیسموتاز (SOD) در بافت کبد نیز بررسی شدند. بررسی‌های هیستولوژیکی با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-اوزین در بافت کبد انجام شد. سطوح سرمی ALT، AST، کلسترول و LDL به طور معنی‌داری در گروه‌های تیمار شده با هارمالین کاهش و سطوح آنزیم‌های آنتی اکسیدان کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و SOD بطور معنی‌داری در گروه‌های تیمار شده افزایش یافت. میزان HDL بطور معنی‌داری در گروه‌های تیمار شده با هارمالین افزایش معنی‌دار یافت. نتایج به دست آمده، اشاره به خواص آنتی اکسیدانی هارمالین دارد که از مهمترین آلکالوئیدهای گیاه اسپند می‌باشد.

کلمات کلیدی: هارمالین، آنتی اکسیدان، کبد چرب غیرالکلی، آنزیم‌های کبدی.

## مقدمه

آید. فاکتورهای بسیار متعددی در ایجاد این بیماری نقش دارد که می‌توان از میان آنها به استرس اکسیداتیو اشاره کرد. استرس اکسیداتیو حاصل از عدم تعادل بین گونه‌ای شیمیایی پرواکسیدان و آنتی اکسیدان می‌باشد که باعث آسیب اکسیداتیو ماکرومولکول‌های سلولی می‌شود. ترکیبات پرواکسیدان غالب در کبد چرب شامل مولکول‌های منفرد اکسیژن، آنیون‌های سوپراکسید، پراکسید هیدرژن و رادیکال‌های

بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) یک علت شایع بیماری مزمن کبدی می‌باشد که یکی از مکانیسم‌های ایجاد آن، مصرف رژیم پرچرب و استرس اکسیداتیو است. اکنون بسیاری از افراد در جمعیت‌های مختلف به آن دچار می‌باشند. شیوع این بیماری در جمعیت‌ها به ۱۵ تا ۲۰ درصد می‌رسد. این اختلال متابولیکی در نتیجه تجمع مقادیر بسیار زیادی تری گلیسرید در سلول‌های کبدی بوجود می‌

منابع ارزشمندی هستند که از زمانهای دور تا امروزه مورد توجه قرار گرفته‌اند. ایران یکی از غنی‌ترین منابع گیاهان دارویی جهان به شمار می‌رود. تعدادی از گیاهان دارویی حاوی مقادیر بالایی از آنتی اکسیدان‌ها هستند که مصرف این گیاهان می‌تواند در سلامتی انسان موثر باشد (۱۶). برخی از گیاهان دارویی به واسطه داشتن آکالولئیدها می‌توانند در غلظت‌های کم، سبب بهبد عملکرد سلولهای بافت کبد چرب شوند (۹). آکالولئیدها ترکیبات آلی نیتروژن دار می‌باشند که در اکثر گیاهان وجود دارند و نقش‌های متفاوتی در گیاه دارند. یکی از گیاهانی که در مطالعات اخیر بسیار به خواص درمانی آن پرداخته شده است گیاه اسپند است (۱۰). گیاه اسپند با نام علمی *Peganum harmala L.* از خانواده Zygophylaceae می‌باشد. ترکیبات شیمیایی گیاه اسپند شامل فلاونوئیدها، آنتراکینون‌ها و آکالولئیدها می‌باشد (۱۸). مهمترین ترکیب شیمیایی اسپند، آکالولئیدهای هارمالین، هارمین و هارمالول می‌باشند. در طب سنتی ایران، از دانه‌های اسپند به عنوان ضدغوفونی کننده استفاده می‌شده است و لازم به ذکر است که به دلیل اثر سمی آن به صورت خوراکی منع شده است (۱۹). مصرف بیش از اندازه آن باعث تحلیل سیستم عصبی، تهوع و تشنج می‌شود. نتایج نشان داده است که عصاره اسپند دارای خاصیت ضد میکروبی و ضد التهابی نیز می‌باشد (۲۱). آکالولئیدهای موجود در اسپند دارای خاصیت ضد سرطان نیز می‌باشند (۱۳). نتایج یک بررسی که بر روی سرطان لوسمی حاد انجام شده است نشان داده است که میزان سمیت مشتقات آکالولئید اسپند یعنی هارمین و هارمالین می‌تواند سبب افزایش آپوپتوز در سلولهای سرطانی شود (۲۰). در این پژوهش از آکالولئید هارمالین که ماده موثره گیاه اسپند می‌باشد در بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی و آنزیم‌های آنتی

هیدروکسیل می‌باشند که در مجموع به عنوان گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) اشاره می‌شوند. اکسیداسیون اسیدهای چرب یک منع مهمی از ROS در کبد چرب می‌باشد (۷). کبد چرب غیرالکلی از طریق افزایش سطح آنزیم‌های آن یعنی ALT و ALP و فاکتورهای التهابی شناسایی می‌شود (۶). کبد چرب غیرالکلی از اختلالات شایع کبد در سراسر جهان بوده که معمولاً با چاقی مفرط، هیپرلیپیدمی و دیابت نوع ۲ همراه است. آزمایشاتی که بر روی کبد بیماران چاق انجام شد نشان‌دهنده کاهش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و محتوای گلوتاتیون (کاهش پتانسیل آنتی اکسیدانی)، و افزایش پراکسیداسیون لیپیدی در سلولهای کبدی می‌باشد (۱). بیماری کبد چرب غیر الکلی طیف وسیعی از بیماری‌های کبدی از استئاتوزیس ساده تا استئوھپاتیت غیرالکلی را که در نتیجه تجمع ذرات چربی در سلولهای کبدی ایجاد می‌شود و می‌تواند منجر به فیبروزیس، سیروزیس و حتی سرطان سلولهای کبد شود را شامل می‌شود (۲۴). دو آنزیم ALT و AST از جمله آنزیم‌هایی هستند که از سلول‌های پارانشیمی کبد آزاد می‌شوند و از قابل اعتمادترین نشانگرها در تشخیص بیماری‌های معنی‌دار کبدی و نکروز می‌باشند (۲۴). ALT نسبت به AST نشانگر اختصاصی تری در التهابات کبدی می‌باشد. AST تنها مختص کبد نیست بلکه در گلبول‌های قرمز خون، پانکراس، کلیه‌ها و ماهیچه‌ی قلب هم حضور دارد (۲). روش‌های متفاوتی برای درمان کبد چرب توسط محققین پیشنهاد می‌شود که یکی از آنها استفاده از گیاهان دارویی است. امروزه در بسیاری از جوامع صنعتی و در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، استفاده از طب سنتی و گیاهان دارویی برای حفظ سلامتی، به علت افزایش اعتماد مردم به استفاده از این گیاهان افزایش پیدا کرده است (۸). گیاهان دارویی

قلب شان به کمک سرنگ انسولین خونگیری انجام شد. تحقیق انجام شده در شرایط کاملاً یکسان و رعایت شرایط استاندارد مطابق اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی انجام شد (شناسه اخلاق IR.IAU.SRB.REC.1398.121). نمونه های خون به سرعت در لوله ها جمع آوری شد و به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۳۷°C با سرعت ۳۵۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. غلظت آنزیم های AST، ALT و ALP و پروفایل لیپیدی با استفاده از روش ایمونواسی و با کیت پارس آزمون انجام شد. برای ارزیابی آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و SOD بلا فاصله بعد از خونگیری از قلب، کبد از بدن خارج شد و با بافر فسفات سالین شسته و به ازای هر گرم از بافت کبد، ۰/۱۵ مولار از KCl محلول اضافه شد. نمونه های کبدی با استفاده از دستگاه هموژنایزر در ۴°C هموژنایز شدند. هموژنات به دست آمده به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۴°C با سرعت ۹۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. محلول رویی جمع آوری شد و با استفاده از کیت پارس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی تغییرات بافتی ناشی از هارمالین بر روی بافت کبد، از رنگ آمیزی نمونه های بافتی با هماتوکسیلین - ائوزین بعد از تثبیت نمونه های کبد حیوانات در فرمالین ۱۰٪ استفاده شد. برش های بافتی زیر میکروسکوپ بررسی شد.

**آنالیز آماری:** تمامی داده ها از نظر آماری با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه (one-way-ANOVA) و آزمون Tukey بررسی شد. نتایج بصورت میانگین ± انحراف معیار گزارش شد. اختلاف میان گروه ها در سطح  $p < 0.05$  معنادار درنظر گرفته شد.

اکسیدانی موش های NMRI مبتلا به کبد چرب استفاده شد.

## مواد و روش ها

در این مطالعه از ۴۰ سر موش بالغ نر نژاد NMRI با وزن تقریبی ۲۰ تا ۲۳ گرم استفاده شد. موش ها از انسستیتوپاستور ایران خریداری شدند. شرایط نگهداری برای همه موش ها یکسان و به صورت ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی و دمای ۲۰°C تا ۲۲°C در نظر گرفته شد. حیوانات بطور تصادفی در ۵ گروه ۸ تایی شامل گروه کنترل ( فقط آب و غذای معمولی دریافت کردند)، گروه HFD ( فقط غذای معمولی به همراه امولسیون پر چرب به مدت ۴ هفته دریافت کردند)، شم (HFD تیمار شده با آب مقطر که حلال هارمالین می باشد به مدت ۴ هفته)، ۲ گروه تیمار شده با ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم هارمالین (سیگما) تقسیم شدند. برای ایجاد کبد چرب در موش های NMRI، از امولسیون پر چرب متشكل از دو رژیم غذایی آزاد و یک ترکیب غذایی پر چرب استفاده شد (در جدول ۱ و ۲ محتویات رژیم غذایی آورده شده است). که بصورت گاواظ به حیوانات خورانده شد. ترکیب رژیم غذایی پر چرب به مدت ۴ هفته همراه با رژیم غذایی آزاد بصورت گاواظ به حیوانات داده شد. به گروه کنترل فقط رژیم غذایی آزاد داده شد. پس از القاء کبد چرب که با آزمایشات بیوشیمیابی و هیستولوژیکی تایید شد، به حیوانات گروه شم، حلال هارمالین تزریق شد. به دو گروه تیمار شده، هارمالین بصورت داخل صفاقی تزریق شد. پس از پایان ۴ هفته، بررسی های بیوشیمیابی و هیستولوژیکی در حیوانات انجام شد. پس از تمام شدن مدت تیمار با هارمالین، حیوانات بیهوش و از

جدول ۱ - ترکیب مواد موجود در پلت غذایی حیوانات

ترکیب	مقدار مصرف
روغن ذرت مایع	۵۰۰ میلی لیتر
روغن قنادی	۱۵۰ میلی لیتر
روغن نباتی	۱۰۰ میلی لیتر
شیر خشک	۱۰۰ گرم
کلسترول	۵۰ گرم

جدول ۲ - ترکیب مواد موجود در امولسیون پرچرب جهت گاواز به حیوانات

ترکیب	مقدار مصرف
روغن ذرت	۲۸۰ میلی لیتر
سدیم اکسی کولات	۱/۴۵ گرم
توئین	۵/۲ میلی لیتر
پروپیلی گلیکول	۴/۵ میلی گرم
کلسترول	۱۴/۳ گرم
شیر خشک نان	۵/۸ گرم
نمک طعام	۱/۴۵ گرم
مولتی ویتامین	۰/۳۳ میلی لیتر
ساکارز	۲۱/۴ گرم
آب مقطّر	۶۵ میلی لیتر


## نتایج

HFD نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری از خود نشان دادند در حالیکه بعد از تیمار با هارمالین سطح آنزیم آنتی اکسیدان بطور معنی داری افزایش پیدا کرد (نمودار ۲). نتایج به دست آمده از پروفایل لیپیدی نشان داد که سطح کلسترول و LDL در گروه HFD بطور معنی داری افزایش پیدا کرده است در حالیکه سطح HDL بطور معنی داری در این گروه کاهش پیدا کرده است. بعد از تیمار با هارمالین، سطح کلسترول و LDL بطور معنی داری نسبت به گروه HFD کاهش و


تجزیه و تحلیل آماری پژوهش حاضر، نشان داد که سطح آنزیم های سرمی ALT و AST در موس های دریافت کننده رژیم پر چرب نسبت به گروه کنترل بطور معنی داری افزایش یافته است. هارمالین در دو غلظت ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم سبب کاهش معنی دار سطح آنزیم های ALT و AST نسبت به گروه HFD و گروه شم شده است (نمودار ۱). سطح آنزیم های آنتی اکسیدانی SOD کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز موجود در کبد گروه

سلول‌های هپاتوسیت بافت کبد در گروه HFD پس از دریافت چهار هفته رژیم پرچرب، رسوب کرده و استئاتوز کبدی را ایجاد کرده بود. در قسمت‌های (ج) و (د) در شکل ۱، تیمار با هارمالین تا حدی سبب ترمیم بافت کبد شده است و تجمع چربی در داخل سلول‌ها کاهش پیدا کرده بود.


سطح HDL نیز بطور معنی داری افزایش پیدا کرده است (نمودار ۳). پس از تهیه و آماده سازی برش‌های بافتی، رنگ آمیزی هماتوکسیلین و اثوزین بر روی نمونه‌ها انجام شد. همانطور که در قسمت (الف) شکل ۱ مشخص است، در برش‌های بافت کبد گروه کنترل سالم هیچ گونه ضایعه و تغییرات بافتی دیده نشد. در قسمت (ب) شکل ۱، قطرات لیپیدی در




نمودار ۱-نتایج تاثیر هارمالین بر روی تغییرات سطح ALT، ALP و AST قبل و بعد از تیمار با هارمالین در مدل موش‌های نر نژاد NMRI با کبد چرب. (# مقایسه با گروه کنترل، \* مقایسه با گروه HFD، \$ مقایسه با گروه شم)



نمودار ۲-نتایج تاثیر هارمالین بر روی تغییرات سطح SOD، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز قبل و بعد از تیمار با هارمالین در مدل موش‌های نر نژاد NMRI با کبد چرب. (# مقایسه با گروه کنترل، \* مقایسه با گروه HFD، \$ مقایسه با گروه شم)



نمودار ۳-نتایج تاثیر هارمالین بر روی تغییرات سطح کلسسترول، LDL و HDL قبل و بعد از تیمار با هارمالین در مدل موش-های نر نژاد NMRI با کبد چرب. (# مقایسه با گروه کنترل، \* مقایسه با گروه HFD، \\$ مقایسه با گروه شام)



شکل ۱-تصویر میکروسکوپی بافت کبد. در این تصاویر نمونه‌ای از هپاتوسیت (نوک پیکان)، فضاهای سینوزیلیدی (فلش)، استئاتوهپاتیت (فلش منقطع) و سیاهرگ مرکزی(CV) نمایش داده شده است. بافت کبد در گروه کنترل سالم (الف)، گروه HFD (ب)، گروه تیمار با هارمالین ۵۰ mg/kg (ج)، گروه تیمار با هارمالین ۱۰۰ mg/kg (د) بزرگنمایی در (الف)، (ب) و (د) ۴۰۰X و در (ج) ۶۴۰X می‌باشد.

## بحث

آن‌تی اکسیدانی برای LDL می‌باشد و مانع از اکسیداسیون آن می‌شود (۱۲). نتایج نشان داد که اثر کاهنگی هارمالین، بیشتر از هارمین می‌باشد (۱۶). در خصوص مکانیسم آنتی اکسیدانی این آلکالوئیدها در تحقیقات نشان داده‌اند که هارمالین و هارمین دارای ظرفیت بالایی در حذف رادیکال‌های آزاد می‌باشند. در راستای پژوهش حاضر، مطالعه‌ای دیگر به بررسی اثر هارمالا بر روی پروفایل‌های لیپیدی موش‌های دیابتی پرداخت و نتایج به دست آمده نشان داد که کاهش قابل ملاحظه‌ای در سطح LDL، کلسترول و گلوکز و افزایش HDL صورت گرفته است که این امر به علت مهار پراکسیداسیون چربی‌ها صورت گرفته است (۱۴). یافته‌ها نشان می‌دهند که هر ۱ mg/dl افزایش در غلظت HDL سرم، می‌تواند منجر به ۲ تا ۳ درصد کاهش خطر بیماری‌های قلبی - عروقی شود (۱۵). بنابراین افزایش معنی‌دار غلظت HDL در گروه کبد چرب دیده شد نشانگر آسیب کبدی می‌باشد. در تایید نتایج به دست آمده، سایبر تحقیقات نشان داده است که عصاره الکلی اسپند باعث کاهش سطح سرمی قند خون، تری‌گلیسرید، کلسترول، LDL و افزایش HDL در موش‌های دیابتی می‌شود (۲۲). محققین زیادی به بررسی اثر هیدروالکلی عصاره اسپند بر میزان فاکتورهای لیپیدی خون در موش‌های نر نژاد NMRI پرداختند (۱۱). در نهایت نتیجه‌گیری شد، با توجه به کاهش کلسترول و LDL سرم پس از استفاده از عصاره گیاه اسپند، این ترکیب می‌تواند به عنوان ترکیب کاهنده‌ی کلسترول و LDL پیشنهاد شود (۲۳). از مکانیسم‌های احتمالی اثرات کاهنده‌ی لیپیدی هارمالین و دیگر آلکالوئیدها، کاهش فعالیت آنزیم استیل کلسترول آسیل ترانسفراز سلول‌های کبدی (که مسئول استریفیکاسیون کلسترول و ذخیره آن می‌باشند) و کاهش فعالیت آنزیم هیدروکسی متیل گلوتاتیون کوآنزیم A گزارش شده است. همسو با مطالعه‌ی حاضر، تحقیقات نشان داده است که هارمین و هارمالین موجود در عصاره دانه اسپند دارای اثرات

در مطالعه‌ی حاضر گروه‌هایی که با هارمالین تیمار شده بودند در مقایسه با گروه HFD، کاهش معنی‌داری در سطح کلسترول، LDL و آنزیم‌های ALP، ALT و AST نشان دادند در حالیکه افزایش SOD معنی‌داری در سطح آنزیم‌های آنتی اکسیدانی کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در گروه‌های دریافت کننده هارمالین نسبت به گروه HFD مشاهده شد که احتمالاً این به دلیل فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی ماده هارمالین می‌باشد. میزان HDL در گروه‌های تیمارشده با هارمالین نیز در مقایسه با گروه HFD افزایش معنی‌داری پیدا کرده بود. افزایش آنزیم‌های ALP، ALT و AST که در نتیجه ایجاد کبد چرب دیده شد نشانگر آسیب کبدی می‌باشد. در تایید نتایج به دست آمده، سایبر تحقیقات نشان داده است که عصاره الکلی اسپند باعث کاهش سطح سرمی قند خون، تری‌گلیسرید، کلسترول، LDL و افزایش HDL در موش‌های دیابتی می‌شود (۲۲). محققین زیادی به بررسی اثر هیدروالکلی عصاره اسپند بر میزان فاکتورهای لیپیدی خون در موش‌های نر نژاد NMRI پرداختند (۱۱). در نهایت نتیجه‌گیری شد، با توجه به کاهش کلسترول و LDL سرم پس از استفاده از عصاره گیاه اسپند، این ترکیب می‌تواند به عنوان ترکیب کاهنده‌ی کلسترول و LDL پیشنهاد شود (۲۳). از مکانیسم‌های احتمالی اثرات کاهنده‌ی لیپیدی هارمالین و دیگر آلکالوئیدها، کاهش فعالیت آنزیم استیل کلسترول آسیل ترانسفراز سلول‌های کبدی (که مسئول استریفیکاسیون کلسترول و ذخیره آن می‌باشند) و کاهش فعالیت آنزیم هیدروکسی متیل گلوتاتیون کوآنزیم A گزارش شده است. همسو با مطالعه‌ی حاضر، تحقیقات نشان داده است که هارمین و هارمالین موجود در عصاره دانه اسپند دارای اثرات

آنژیمی نشان می‌دهد که موش‌های تغذیه شده با جیره غذایی پرچرب قادر به مهار رادیکال‌های آزاد که باعث آسیب بافت‌ها می‌شوند، نیستند. مشخص شده است که تجمع چربی در کبد، حساسیت این بافت را نسبت به سایر عوامل آسیب رسان نظیر تنفس‌های اکسیداتیو افزایش می‌دهد که خود باعث پیشرفت استئاتوز به سمت استئاتوسیت؛ فیروز و سیروز می‌شود.

### نتیجه گیری

باتوجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه و نیز باتوجه به مطالعات صورت گرفته در این حیطه، می‌توان گفت که اضافه کردن یک رژیم پرچرب میتواند از طریق استرس اکسیداتیو و با ایجاد تغییر در ساختار بافتی کبد سبب افزایش فعالیت ترانس آمینازها و نیز افزایش معنی داری در میزان کلسترول و LDL و کاهش معنی داری در میزان HDL شود. به نظر می‌رسد هارمالین از طریق کاهش سطح آنژیم‌های کبدی، افزایش میزان آنژیم‌های آنتی اکسیدانی، افزایش سطح HDL و بهبود پروفایل‌های لیپیدی یعنی کلسترول و LDL و بهبود ساختار بافتی کبد توانسته است به خوبی از طریق حذف رادیکال‌های آزاد و اثرات ضد التهابی منجر به بهبود بیماری کبد چرب غیر الكلی شود. با توجه به اهمیت بیماری‌های کبدی و نبود داروهای مناسب جهت درمان فیروز و نکروز کبدی، اثرات هارمالین جالب توجه بوده و می‌تواند در آینده کاندید مناسبی جهت داروهای موثر در نظر گرفته شود.

### تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پژوهش انجام شده در دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می‌باشد که با حمایت‌های معنوی و مالی حوزه معاونت محترم پژوهشی آن واحد به انجام

هیدروالکلی دانه‌ی اسپند، علت اثر مثبت این عصاره به برخی پارامترهای بیوشیمیایی می‌تواند وجود این ترکیبات باشد (۱۷). هم راستا با گزارشات پیشین، مطالعه حاضر نشان داد که ماده موثره دانه اسپند یعنی هارمالین به طور معناداری باعث کاهش کلسترول و LDL خون در موش‌های نر نژاد NMRI دریافت کننده رژیم پرچرب شد که این امر احتمالاً به دلیل اثر هارمالین بر کاهش بیان ژن آسید چرب ستاز و کاهش فعالیت آنژیم هیدروکسی متیل گلوتاتیون کوآنژیم A می‌باشد (۳). این کاهش وابسته به دوز می‌باشد. ALT و AST شاخص‌های رایج آسیب کبدی در انواع بیماری‌های کبدی می‌باشند. در شرایط عادی، مقدار ALT و AST در سلولهای کبدی بسیار اندک می‌باشند. هنگامی که یک آسیب حاد یا مزمن در کبد وجود داشته باشد، این آنژیم‌ها از سلول‌های کبدی به داخل گردش خون آزاد می‌شوند و سطح سرمی و کبدی آنها افزایش پیدا می‌کند. افزایش خفیف تا متوسط آمینوتранسفرازهای کبدی، ALT و AST رایج‌ترین علامت آزمایشگاهی می‌باشند که در ارزیابی و تشخیص NAFLD به کار گرفته می‌شود به طوری که استرس اکسیداتیو ناشی از پراکسیداسیون لیپیدی، باعث کاهش ضخامت غشاء سلول‌های کبدی شده و در نهایت باعث آزاد شدن آنژیم‌های کبدی به داخل سرم می‌شود (۴). افزایش سطح آنژیم‌های کبدی که با بیماری کبد چرب غیر الكلی در ارتباط است، به نوبه‌ی خود با رسوب چربی احشایی و مقاومت بدن به انسولین در ارتباط است. نشانگرهای التهابی شامل، افزایش سنتز اسیدهای چرب و تجمع چربی کبدی می‌باشد که می‌توانند در افزایش آنژیم‌های کبدی و بروز دیابت موثر باشند (۵). نتایج بررسی حاضر نشان داد که جیره غذایی پرچرب منجر به کاهش SOD، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز شد. اختلال در پتانسیل آنتی اکسیدانی

for potential anti-inflammatory effects targeting nuclear factor-Kappa B and other pro-inflammatory mediators. *Journal of ethnopharmacology*, 124(2): 295-305.

8- Chabir N., Ibrahim H., Romdhane H., Valentin A., Moukarzel B. 2014. Seeds of Peganum Harmala L. chemical analysis, antimalarial and antioxidant activities, and cytotoxicity against human breast cancer cells. *Medicinal chemistry*, 11(1): 94-101.

9- Daoud A., Song J., Xiao F., Shang J. 2014. A novel beta-carboline derivative exhibits anti-cancer activity via induction of apoptosis and inhibition of cell migration in vitro. *European journal of pharmacology*, 724: 219-230.

10- El Gendy M.A., Somayaji V., El-Kadi A.O. 2010. Peganum harmala L. is a candidate herbal plant for preventing dioxin mediated effects. *Planta medica*, 76(7): 671-677.

11- Ghaffar S., Afridi S.K., Aftab M.F., Murtaza M., Syed S.A. 2016. Attenuation of palmitate induced insulin resistance in muscle cells by harmala, clove and river red gum. *Pakistan journal of pharmaceutical sciences*, 29(5): 1795-1800.

12- Hadadi Z., Nematzadeh G.A., Ghahari S. 2020. A study on the antioxidant and antimicrobial activities in the chloroformic and methanolic extracts of 6 important medicinal plants collected from North of Iran. *BMC chemistry*, 14(1): 33.

13- Hamsa T., Kuttan G. 2011. Studies on anti-metastatic and anti-invasive effects of harmine using highly metastatic murine B16F-10 melanoma cells. *Journal of environmental pathology, toxicology and oncology : official organ of the International Society for Environmental Toxicology and Cancer*, 30(2): 123-137.

14- Ibraheem Z.O., Abdul Majid R., Mohd Noor S., Mohd Sidek H., Basir R. 2015. The Potential of beta Carbolin Alkaloids to Hinder Growth and Reverse Chloroquine Resistance in Plasmodium falciparum.

رسیده است. بدین‌وسیله از کمک و باری این عزیزان  
قدرتانی و تشکر می‌شود.

#### منابع

- 1- Abedi G.F., Abedi G.Y., Moazenzade K.O., Mardomi A., Ghahremanzadeh K. 2015. Effects of a triplex mixture of Peganum harmala, Rhus coriaria, and Urtica dioica aqueous extracts on metabolic and histological parameters in diabetic rats. *Pharmaceutical biology*, 53(8): 1104-1109.
- 2- Abolhassanzadeh Z., Aflaki E., Yousefi G., Mohagheghzadeh A. 2015. Randomized clinical trial of peganum oil for knee osteoarthritis. *Journal of evidence-based complementary & alternative medicine*, 20(2): 126-131.
- 3- Behairy A., Abd El-Rahman G.I., Aly S.S.H., Fahmy E.M., Abd-Elhakim Y.M. 2021. Di(2-ethylhexyl) adipate plasticizer triggers hepatic, brain, and cardiac injury in rats: Mitigating effect of Peganum harmala oil. *Ecotoxicology and environmental safety*, 208: 111620.
- 4- Bensalem S., Soubhye J., Aldib I., Bourrine L., Nguyen A.T. 2014. Inhibition of myeloperoxidase activity by the alkaloids of Peganum harmala L. (Zygophyllaceae). *Journal of ethnopharmacology*, 154(2): 361-369.
- 5- Berrougui H., Isabelle M., Cloutier M., Hmamouchi M., Khalil A. 2006. Protective effects of Peganum harmala L. extract, harmine and harmaline against human low-density lipoprotein oxidation. *The Journal of pharmacy and pharmacology*, 58(7): 967-974.
- 6- Bourogaa E., Jarraha R.M., Damak M., Elfeki A. 2015. Hepatoprotective activity of Peganum harmala against ethanol-induced liver damages in rats. *Archives of physiology and biochemistry*, 121(2): 62-67.
- 7- Bremner P., Rivera D., Calzado M.A., Obon C., Inocencio C. 2009. Assessing medicinal plants from South-Eastern Spain

- 20- Panahi Y., Saadat A., Seifi M., Rajaee M., Butler A.E., Sahebkar A. 2018. Effects of Spinal-Z in Patients with Gastroesophageal Cancer. *Journal of pharmacopuncture*, 21(1): 26-34.
- 21- Rezaei M., Nasri S., Roughani M., Niknami Z., Ziai S.A. 2016. Peganum Harmala L. Extract Reduces Oxidative Stress and Improves Symptoms in 6-Hydroxydopamine-Induced Parkinson's Disease in Rats. *Iranian journal of pharmaceutical research*, 15(1): 275-281.
- 22- Singh A.B., Chaturvedi J.P., Narender T., Srivastava A.K. 2008. Preliminary studies on the hypoglycemic effect of Peganum harmala L. Seeds ethanol extract on normal and streptozotocin induced diabetic rats. *Indian journal of clinical biochemistry*, 23(4): 391-393.
- 23- Wang Y., Wang H., Zhang L., Zhang Y., Sheng Y. 2019. Subchronic toxicity and concomitant toxicokinetics of long-term oral administration of total alkaloid extracts from seeds of Peganum harmala Linn: A 28-day study in rats. *Journal of ethnopharmacology*, 238: 111866.
- 24- Zhang L., She Z., Li H. 2020. Non-alcoholic fatty liver disease: a metabolic burden promoting atherosclerosis. *Clinical Science(Lon)*, 134(13): 1775-1799.
- 15- Im J.H., Jin Y.R., Lee J.J., Yu J.Y., Han X.H. 2009. Antiplatelet activity of betacarboline alkaloids from Peganum harmala: a possible mechanism through inhibiting PLCgamma2 phosphorylation. *Vascular pharmacology*, 50(5-6): 147-152.
- 16- Jalali A., Dabaghian F., Zarshenas M.M. 2021. Alkaloids of Peganum harmala: Anticancer Biomarkers with Promising Outcomes. *Current pharmaceutical design*, 27(2): 185-196.
- 17- Karam M.A. ,Abd-Elgawad M.E., Ali R.M. 2016. Differential gene expression of salt-stressed Peganum harmala L. *Journal, genetic engineering & biotechnology*, 14(2): 319-326.
- 18- Lei Y.J., Xia Z.F., Luo X.X., Zhang L.L. 2020. Actinokineospora pegani sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from the surface-sterilized root of Peganum harmala L. *International journal of systematic and evolutionary microbiology*, 70(7): 4358-4363.
- 19- Moshiri M., Etemad L., Javidi S., Alizadeh A. 2013. Peganum harmala intoxication, a case report. *Avicenna journal of phytomedicine*, 3(3): 288-292.